



ประเภท : ทั่วไป

หัวข้อข่าว : ประกาศ Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

โดย : PSRD\_ADMIN

ลงวันที่ : พุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

เข้าชม : 4352

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า

ที่ประชุมมีมติประกาศให้ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ของไทย

โดยการมีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

ซึ่งการประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่สามารถได้กฎหมายในการควบคุมโรคระบาดได้ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ หลังจากนั้นจะเสนอมติให้ รวบรวมสาธารณสุข ลงนามก่อนจะประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้เร็วที่สุดต่อไป

ส่วนสถานการณ์โรคในประเทศไทยยังอยู่ในระยะระบาดระดับ 2 ไม่ใช่ระดับ 3 ตามที่มีกระแสข่าวปรากฏในสื่อ

## สำหรับโรคติดต่อร้ายแรงในไทย ที่กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ดังนี้

1. กาฬโรคต่อมท่อน้ำเหลือง (Bubonic plague) กาฬโรคต่อมท่อน้ำเหลือง (Bubonic plague) มีอาการไข้สูง หนาวสั่น เจ็บคอ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบหรือรักแร้โตและมีหนอง หรือมีฝีมีหนอง

-กาฬโรคชนิดโลหิตเป็นพิษ (Septicemic plague) มีอาการของโลหิตเป็นพิษ ไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน คอหอยและทอนซิลอักเสบ อาจมีเชื้อท่มสมองอักเสบและจ้ำเลือดตามผิวหนัง

-กาฬโรคปอด (Pneumonic plague) มีอาการไข้สูง หนาวสั่น ไอมีเสมหะปนเลือด หอบ เมื่อถ่ายภาพเอกซเรย์ที่ปอดจะพบลักษณะของปอดอักเสบ

2. ไข้ทรพิษ (Smallpox) มีอาการไข้สูง ปวดตามตัว ปวดศีรษะ ปวดหลัง อ่อนเพลีย อาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย ระยะก่อนจะมีผื่นขึ้นจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หลังจากนั้นไข้สูงแล้วจะปรากฏผื่นขึ้นต่อมาจะกลายเป็นตุ่มตุ่มใสตุ่มหนองและตกสะเก็ดเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์

โดยผื่นจะปรากฏที่บริเวณใบหน้าและตามท่อน้ำเหลืองก่อน โดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสหรือสัตว์พาหะนำโรคแล้ว อาจทำให้เกิดแผลเป็นรอยบุ๋มและอาจทำให้เกิดความพิการจนถึงขั้นตาบอดได้

3. ไข้เลือดออกโครีเมียนคองโก (Crimean – Congo hemorrhagic fever)มีอาการเริ่มอย่างเฉียบพลัน โดยมีไข้ปวดกล้ามเนื้อ มีผื่นงู ปวดคอร่วมกับคอแข็ง ปวดหลัง ปวดศีรษะ เจ็บตา ใบหน้าแดงและกล้ามเนื้อ

บางรายอาจพบอาการคลื่นไส้อาเจียนและเจ็บคอในระยะแรก ซึ่งมักพบร่วมกับท้องร่วงและปวดท้อง ต่อมาจะมีอาการหน้าแดง ไข้สูงและก้าวร้าว จากนั้นอาจมีอาการง่วงซึมเศร้า ไข้ใจเต้นเร็ว ต่อมน้ำเหลืองโต มีเลือดออกใต้ผิวหนังและเยื่อต่างๆ เช่น

ปากเหือด ปากสาก และพบเลือดออกจากรูส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร มีเลือดปนในปัสสาวะ มีเลือดกำเดา และเลือดออกจากรูจมูก ในบางรายอาจพบอาการของตับอักเสบ

4. ไข้เวสต์ไนล์ (West Nile Fever) มีอาการไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น มีเหงื่อออก มีผื่นที่ผิวหนัง อ่อนเพลีย ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ซึมปวดข้อ และมีอาการคล้ายไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ บางรายมีอาการคลื่นไส้อาเจียน

ในรายที่มีอาการรุนแรงมีอาการทางสมองร่วมด้วย เช่น สมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีไข้สูง คอแข็ง ซึม ชักและหมดสติ

5. ไข้เหลือง (Yellow fever) มีอาการไข้สูงเฉียบพลันเป็นระยะเวลา 5-7 วัน ปวดศีรษะ ปวดหลัง อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน อาจมีเลือดกำเดาเลือดออกในปากและถ่ายเป็นเลือด จะมีอาการตัวเหลืองหรือตาเหลืองในระยะแรก อาจมีอาการมากขึ้นในระยะต่อมา และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

6. ไข้ไลลาสาธา (Lassa fever) มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไออาเจียน ท้องร่วง เจ็บหน้าอกและปวดบริเวณข้อต่อ อาการไข้จะยังคงมีอยู่ตลอดหรืออาจไข้สูงเป็นระยะ มีอาการตาอักเสบ คออักเสบ และเป็นหนอง

บางรายที่มีอาการรุนแรงมีอาการเลือดออกอีก มีอาการบวมที่หน้า และคอจะมีปริมาณเกล็ดเลือดลดลงและการทำงานของเกล็ดเลือดผิดปกติ บางรายอาจมีอาการหูหนวกภายหลังที่เส้นประสาทสมองคู่ที่ 8

7. โรคติดต่อไวรัสนิปปาห์ (Nipah virus disease) มีอาการคล้ายไข้หวัด มีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ สมองอักเสบ บางรายอาจมีอาการของระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย หรืออาจมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางระบบประสาท

เช่น ไข้เวียนศีรษะ เดินโซเซซึมซิบสนหรือชัก มีการเคลื่อนไหวของลูกตาผิดปกติ แขนและขามีอาการกระตุก ความดันโลหิตและชีพจรแปรปรวน และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

8. โรคติดต่อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease) มีอาการไข้สูงเฉียบพลัน อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะมาก ตามมาด้วยอาการเจ็บคอ อาเจียน ท้องเสียและมีผื่นแดงตามตัว

มีอาการเลือดออกง่ายซึ่งมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทำลาย ไตวาย มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลางชัก อวัยวะหลายระบบเสื่อมหน้าที่และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

9. โรคติดต่อไวรัสอีโบล่า (Ebola virus disease – EVD) มีอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะและเจ็บคอ ตามมาด้วยอาการอาเจียน ท้องเสียและมีผื่นขึ้น บางรายจะมีเลือดออกทั้งในอวัยวะภายในและภายนอก

ในรายที่มีอาการรุนแรงพบว่ามึนงงหรือวิงเวียน และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่จะมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย หรือตายด้วยโรคติดต่อไวรัสอีโบล่า (Ebola virus disease – EVD)

10. โรคติดต่อแฮนดรา (Handra virus disease) มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไข้สูง เวียนศีรษะและสับสน หรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ในระยะแรกมักจะมีอาการปวดคออักเสบ

ในรายที่มีอาการรุนแรงมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

11. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) มีอาการไข้ ไอหอบ บางรายมีอาการในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสียอาเจียน

ในรายที่มีอาการรุนแรงมีอาการแสดงของโรคปอดอักเสบ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว อวัยวะล้มเหลว โดยเฉพาะไตวาย และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

12. โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome – MERS) มีอาการไข้ ไอหอบ บางรายมีอาการในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย อาเจียน



ในรายที่มีอาการรุนแรงมีอาการแสดงของโรคปอดอักเสบ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว อวัยวะล้มเหลว โดยเฉพาะไตวาย และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

13. วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug – resistant tuberculosis (XDR – TB)) เป็นวัณโรคที่มีการดื้อยา 4 ขนานร่วมกัน ได้แก่ ไอโซไนอะไซด์ (Isoniazid) ริแฟมพิซิน (Rifampicin) กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)

และกลุ่มยาทางเลือกที่สองที่เป็นยาชนิดฉีด (Second – line injectable drugs) มีอาการไอเรื้อรังหรือไอเป็นเลือด เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย มีไข้ เจ็บหน้าอกหอบเหนื่อย สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

- ในรายที่มีอาการรุนแรงมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
14. COVID -19 หรือตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019